

HEMÍPTEROS DE LA PROVINCIA DE CIUDAD REAL  
NO CITADOS COMO DE LA PENÍNSULA IBÉRICA  
EN EL CATÁLOGO DE OSHANIN DE 1912 (1)

por

**José María de la Fuente, Pbro.**

En el número correspondiente a Mayo y Junio de 1920 del *Boletín de la Sociedad Entomológica de España*, aparece un artículo, de D. Ascensio Codina, bajo el epígrafe de «Lista inédita de Homópteros (Hemípteros) de Cataluña».

Conformes en un todo con lo que allí dice nuestro excelente amigo, creemos también útil, como dicho señor hace respecto a Cataluña, adelantar los nombres de los hemípteros inéditos de esta región manchega para que no pierdan la primacía del hallazgo. A esto obliga la lentitud con que salen a luz los trabajos de alguna extensión, como nuestro *Catálogo de los coleópteros de la Península ibérica*, por citar algún caso, que lleva ya casi tres años de publicación y apenas alcanza lo publicado a la mitad de los carábidos.

Entre las especies que siguen no se ponen, como es natural, las descritas después de la aparición del Catálogo de Oshanin ni las variedades que carecen en el mismo de patria expresa.

Todos los hemípteros proceden de nuestras cazas personales en los lugares que se citan.

**Heteroptera** Latr., 1810.

Fam. **PENTATOMIDAE** LEACH, 1815

*Irochrotus lanatus* Pall., 1773.—Dos ejemplares en el Montecillo, entre Pozuelo y Almagro. Junio.

*Eusarcoris inconspicuus* H. S. var. *simplex* Put. 1881. — Un sólo ejemplar en Pozuelo, sobre una *Resedácea*. Mayo.

Variedad caracterizada por la ausencia de callosidades blancas en la base del escudete.

— — var. *Herferi* Fieb., 1861. — Común en sitios frescos, sobre los juncos, y la *Reseda lutea* var. *gracilis* G. G., en la ribera de los ríos Guadiana y Jabalón y entre la hierba de los huertos. De Mayo a Octubre.

---

(1) *Katalog der paläarktischen Hemipteren (Heteroptera, Homoptera-Auchenorrhyncha und Psylloideae)*, von B. Oshanin. Berlín, 1912.



- Peribalus sphacelatus* F. var. *suboblongus* Rey, 1888. — Poco comun en los cerros de Pozuelo y La Solana, sobre las flores del cantueso (*Lavandula pedunculata* L.), y en los *Verbascum*. De Marzo a Octubre.
- Brachynema virens* Klug, 1845. — Raro en Pozuelo, al borde de los caminos y barbechos, sobre *Atriplex hastata* L. Agosto, Setiembre.
- Nezara Millierei* M.-R., 1866. — Poco frecuente en la Dehesilla de Ballesteros, sobre *Fistacia terebinthus* L. De Julio a Octubre.

Fam. COREIDAE Leach, 1815

- Gonocerus acuteangulus* Goeze var. *simulator* Reut., 1891. — Pozuelo. Un sólo ejemplar en Julio, sobre una encina.
- Strobilotoma divergens* Reut., 1900. — Raro en Pozuelo, junto a la ermita extramuros de la Virgen de los Santos, laguna de la Argamasilla y orillas del Jabalón. De Abril a Noviembre.
- Stenocephalus setulosus* Ferr., 1874. — Muy raro en Pozuelo, sobre diversas plantas. Julio.
- Camptopus lateralis* Germ. var. *brevipes* H. S., 1839. — En las dehesas de Almagro, Pozuelo y La Solana, sobre *Ulex europaeus* Sm. y algunas *Umbeliferas*. Casi todo el año, con el tipo.
- Corixus rufus* Schill., 1817. — Algo frecuente en los prados y dehesas de la provincia. Todo el año.
- — var. *lepidus* Fieb., 1861. — Raro en Pozuelo, en las colinas áridas de la Virgen de los Santos. De Enero a Mayo.
- Agraphopus femoralis* Horv., 1897. — Bastante raro en Pozuelo, sobre la hierba fresca de los huertos, en la ribera del Jabalón y en las isletas de la laguna de La Inesperada. De Mayo a Noviembre. También en Almagro.

Fam. LYGAEIDAE Schill., 1829

- Spilostethus pandurus* Scop. var. *militaris* F., 1775. — Más frecuente que el tipo *pandurus*, se halla esparcido por la provincia, habitando los prados húmedos, sobre *Senecio Jacobaea* L., los sembrados, dehesas y jardines. Todo el año.

A veces, tanto en el tipo como en la variedad, las dos bandas negras del pronoto se hallan reunidas por detrás.

- Spilostethus equestris* L. var. *lactans* Horv., 1898. — Mezclada a la forma típica sobre los cardos, y a veces en los cerros sobre *Vincetoxicum nigrum* Moench, se coge esta variedad, que el Dr. Horvath (*Rev. d'Ent.*, Caen. 1898, pág. 283) caracteriza así: *Membrana lactea, tantum macula parva media marginis basalis nigra*.

Indicada de Argelia solamente, constituye buena adquisición para nuestra fauna.

- Lygaeosoma reticulatum* H. S. var. *erythropterum* Put., 1876. — Muy común en Pozuelo, mezclada con el tipo, entre la hierba de los prados y bajo las cortezas semidesprendidas de los árboles. Todo el año. En Setiembre abunda en las islas de la laguna de la Inesperada.



*Arocatus Roeseli* Schill. var. *intermedius* Put. 1878.—Fuencaliente, Junio. Un solo ejemplar bajo la corteza de un olmo.

*Nysius lineatus* Costa var. *brunneus* Fieb., 1861. — Dos individuos en Pozuelo y uno en Fuencaliente. Junio, Julio.

*Henestaris halophilus* Burm., 1835. — Raro en Pozuelo y La Solana de Julio a Noviembre. Generalmente mezclado con *Henest. laticeps* Curt. entre la barrilla (*Salsola vermiculata* L.) en las islas de la Inesperada y Los Tejares, de aquellas dos poblaciones, respectivamente.

*Brachyplax palliata* Costa var. *linearis* Scott, 1873. — Media docena de ejemplares en la ribera del Jabalón y en el prado juncal de Pozuelo. Julio.

En estos ejemplares el escudo es pardo amarillo. Scott (1872) dice que es negro.

*Plinthisus pusillus* Schltz., 1846. — Raro en Pozuelo por el mes de mayo, debajo de las piedras en el cerro de San Cristóbal.

*Stygnocoris Mayeti* Put., 1879. — Raro en la laguna de la Argamasilla, en el prado de Casa-Talavera y otros sitios húmedos de Pozuelo. Casi todo el año.

*Lasiocoris apicimacula* Costa 1852. — Se halla en Pozuelo, donde es muy escaso, debajo de las piedras o corriendo por el suelo con gran agilidad. Abril.

#### Fam. BERYTIDAE Fieber, 1851

*Berytus distinguendus* Ferr. 1874. — Común en la dehesa del Acebuchal, entre Almagro y Pozuelo, de Agosto a Diciembre, sobre *Mercurialis annua* L.

#### Fam. TINGITIDAE Costa, 1838

*Cantacader laticollis* Horv., 1906.—Muy raro en los prados de Pozuelo, pegado a las piedras por debajo. Casi todo el año, especialmente en invierno. Especie nueva para Europa.

*Derephysia sinuatocollis* Put., 1879.—Rara en Fuencaliente, debajo de las piedras, y a veces sobre *Artemisia campestris* L. Junio.

*Tingis ajugarum* Frey-Gessn., 1872.—Poco frecuente en la dehesa del Acebuchal y alrededores de la Virgen de los Santos, sobre *Ajuga chamaepitys* Schreb. Junio. También en Villar del Pozo. Octubre.

*Tingis auriculata* Costa var. *dauci* Horv., 1905. — Rara en Pozuelo y Ciudad Real, sobre las zanahorias silvestres (*Daucus carotta* L.). Gran parte del año.

*Copium teucrii* Host. var. *intermedium* Rey, 1888. — Muy raro en las dehesas y montes de Pozuelo y La Solana, sobre *Teucrium pseudo-chamaepitys* L., en cuya planta determina una especie de agalla.

#### Fam. HEBRIDAE Fieber, 1851

*Hebrus pusillus* Fall. var. *rufescens* Rey, 1893. — Muy raro en la ribera del Jabalón y del arroyo de Cantalejo, bajo los detritus vegetales y sobre las plantas pantanosas (*Lemna*). Junio, Setiembre.



## Fam. ANTHOCORIDAE A. S., 1843

*Triphleps nigra* Wolff var. *Ullrichi* Fieb., 1860. — Abunda en toda la provincia, sobre las flores del cardo corredor (*Eryngium campestre* L.), de las escobas comineras (*Artemisia*), del gordolobo (*Verbascum*), etc. Todo el año.

## Fam. CAPSIDAE Burm. 1835

*Lygus campestris* L. var. *algericus* Reut., 1896. — Tan frecuente o más que el tipo por toda la provincia, con el que se coge sobre *Inula viscosa* Ait. *Pastinaca sativa* L., *Anethum graveolens* L., *Urtica dioica* L. De Abril a Octubre

La larva deforma la inflorescencia.

*Camptobrochus punctulatus* Fall. var. *serenus* Dgl. et Sc., 1868. — Se coge alguna vez, entre los ejemplares típicos, en la alfalfa, *Tanacetum vulgare* L., *Eryngium campestre* L. Extendido por la provincia de Abril a Noviembre.

*Deraeocoris punctum* Ramb. var. *corruscus* Garb., 1869. — Raro en Fuencaliente, sobre los *Carduus*. Junio.

— — var. *pseudoschach* Reut., 1894. — Alrededores del santuario de la Virgen de los Santos, en Pozuelo. Mayo.

Nueva para Europa. Sólo se cita de Túnez.

*Pilophorus confusus* Kbm., 1855. — Dos ejemplares en la alameda de la Virgen de los Santos, sobre *Populus nigra* L., en Julio y Octubre. En Fuencaliente es menos raro. Junio.

*Halticus luteicollis* Panz. var. *vitticeps* Reut., 1902. — Común en Fuencaliente en Junio, sobre el *Galium verum* L. y *Clematis vitalba* L., chupando el parénquima de las hojas.

*Oncotylus setulosus* H. S., 1839. — Muy raro en la Virgen de los Santos, de Pozuelo, y en la Dehesilla, de Ballesteros, sobre *Centaurea paniculata* Boll.

*Tinicephalus flavopilosus* Reut., 1879. — Frecuente en las dehesas de Pozuelo y en Fuencaliente en Junio y Julio, sobre la flor de la retama (*Retama sphaerocarpa* Boiss.).

*Megalocoleus pilosus* Schrank, 1801. — Comun en Pozuelo y Fuencaliente, sobre *Tanacetum vulgare* L. Mayo, Junio.

*Amblytylus albidus* Hahn, 1834. — No es raro en los cerros y montes de Pozuelo, sobre *Sarothamnus vulgaris* Wimm. (*scoparius* Koch.). Junio.

*Macrotylus elevatus* Fieb., 1858. — Dos ejemplares en la dehesa del Acebuchal, entre Almagro y Pozuelo. Junio. Muy raro también en Fuencaliente, en Junio.

*Plagiognathus flavipes* Reut., 1875. — Fuencaliente, Junio. Abunda.

*Campylomma annulicornis* Sig., 1865. — Muy raro en el Montecillo y cercanías del santuario de la Virgen de los Santos, de Pozuelo; a veces también en las plantas semiacuáticas. Setiembre, Octubre.

*Paredrocoris pectoralis* Reut., 1884. — Se coge en Pozuelo en Mayo y Junio sobre *Euphorbia serrata* L. Muy raro.



## Fam. ISOMETOPIDAE Fieber, 1860

*Isometopus intrusus* H. S. 1842. — De vez en vez se coge algún individuo sacudiendo las encinas del Montecillo. Abril.

## Homoptera Latr. 1824

## Fam. MEMBRACIDAE Germ., 1821

*Gargara genistae* F., 1794. — Pozuelo. Muy raro en la dehesa del Acebuchal y en la Dehesilla de Ballesteros sobre *Retama sphaerocarpa* Boiss. y *Daphne gnidium* L. Junio.

## Fam. JASSIDAE Stål, 1858

*Aglena ornata* H. S., 1838. — Poco frecuente en Pozuelo, magueando en las orillas del Jabalón de Mayo a Julio. También se recoge la var. *pallida* Walk., que no admiten los autores por su falta de fijeza, pues hay formas intermedias en las cuales ambos colores (negro y amarillo) se hallan repartidos casi por iguales partes.

*Idiocerus fasciatus* Fieb., 1868. — Raro en los álamos de la Virgen de los Santos, de Mayo a Noviembre.

— *albicans* Kbm., 1868. — Muy raro, con el anterior en la alameda de los Santos sobre *Populus alba* L., de Mayo a Setiembre.

*Pediopsis glandacea* Fieb., 1868. — Algo frecuente en la alameda antes citada y en la Celadilla sobre el *Ulmus campestris* L. Junio.

— *nana* H. Sch., 1836. — Frecuente en los cerros, montes y dehesas de Pozuelo en Junio sobre *Artemisia campestris* L.

*Eupelix depressa* F. var. *marginata* Sign., 1879. — Pozuelo. Dos ejemplares en la colina llamada Cabeza Parda. Enero.

*Acocephalus histrionicus* F., 1794. — Laguna de la Argamasilla y cercanías de la Virgen de los Santos, en la hierba fresca, Mayo. También en Villar del Pozo. Abril.

*Platymetopius rostratus* H. Sch., 1834. — Dos individuos junto al prado de Casa-Talavera. Pozuelo, Noviembre.

— *filigranus* Scott, 1876. — Raro en los acirates del camino de Hervideros de Fuensanta, en Pozuelo. Junio.

*Deltocephalus cephalotes* H. S., 1834. — Raro en junio en el prado juncal de Pozuelo.

— *striifrons* Kbm., 1868. — Ciudad Real. Muy raro en la ribera del Guadiana. Setiembre.

*Athysanus limbatus* Ferr., 1882. — Frecuente en las dehesas y montes de Pozuelo, La Solana y Villar del Pozo sobre el romero (*Rosmarinus officinalis* L.) y *Artemisia campestris* L. De Junio a Agosto con una variedad sin faja lateral blanca.

— *lineolatus* Brullé var. *maculosus* Rey, 1891. — Con el tipo en los huertos y prados de Pozuelo de Enero a Abril, pero mucho más raro.

— *impictifrons* Boh., 1851. — Poco frecuente en el Montecillo y cerro de San Cristóbal, de Pozuelo, sobre *Artemisia campestris* L. De Junio a octubre.



*Thamnotettix fenestratus* H. S. var. *guttulatus* Kbm., 1868 — Dos individuos en la Dehesilla de Ballesteros, en Setiembre. Fuencaliente, Octubre, raro.

— *haematocephus* M. R. var. *minor* Ferr., 1884. — Dehesa del Acebuchal, entre Almagro y Pozuelo; muy raro en Diciembre.

— *vittiventris* Leth., 1876. — Alrededores del Santuario de la Virgen de los Santos. Frecuente en Setiembre y Octubre.

— *fraudulentus* Horv., 1903. — Escaso en la Dehesilla de Ballesteros. Octubre. Citado solamente de Servia y Hungría.

*Cicadula fasciifrons* Stål, 1858. — Cerros de la Virgen de los Santos, en Pozuelo, Mayo. Fuencaliente, Octubre. Raro.

En la descripción de la especie indica Lethierry (*Soc. d'Hist. Nat. de la Moselle*, 1879) que el dorso del abdomen está marginado de amarillo en la extremidad de cada segmento. Mis cuatro individuos sólo tienen marginados de amarillo los dos últimos.

— *variata* Fall., 1806. — Poco frecuente en Pozuelo de Mayo a Agosto.

— *erythrocephala* Ferr., 1882. — Alrededores de la Virgen de los Santos, sobre *Andropogon hirtum* L. Bastante frecuente en Setiembre y Octubre,

*Dicraneura citrinella* Zett., 1828. — Muy común en toda la provincia y todo el año sobre las plantas pantanosas, principalmente sobre *Geranium Robertianum* L.

*Typhlocyba gratioia* Boh., 1851. — Fuencaliente, Junio. Algunos ejemplares mangleando los alisos de los arroyos.

*Erythroneura hyperici* H. S., 1826 — Rara en los huertos de Pozuelo y Fuencaliente, sobre *Hypericum perforatum* L. De Junio a Octubre.

— *fasciaticollis* Rey, 1891. — Pozuelo. Muy rara en Agosto en el prado de Casa-Talavera,

*Erythroneura lunaris* M. R., 1855. En Fuencaliente se coge con alguna frecuencia, de Junio a Octubre, sobre *Rubus fruticosus* L.

— *tamaricis* Put., 1872. — Villar del Pozo. Escasa en la huerta de Calso sobre *Tamarix gallica* L. Octubre.

#### Fam. CIXIIDAE Degl. Sc., 1876

*Oliarus splendidus* Fieb., 1876. — Pozuelo y Fuencaliente, sobre los charros de las dehesas. Algo frecuente en Mayo y Junio.

— *obscurus* Sign. 1865. — Escaso en Pozuelo en la ribera del Jabalón y en la Dehesilla de Ballesteros, Julio. Común en La Solana sobre encinas y en sitios húmedos. Junio, Julio.

#### Fam. DELPHACIDAE Leach, 1815

*Araeopus pulchellus* Curt., 1833. — Raro en los prados húmedos y riberas de la provincia sobre las *Ciperáceas*. De Junio a Octubre.

*Stenocranus minutus* F., 1794. — La Solana. Frecuente en el sitio llamado Valle-Hermoso, en las márgenes del río Azuel, en Junio y Julio.

*Kelisia perspicillata* Boh., 1845. — Se coge en Pozuelo de Mayo a Julio. Escasa.



*Chloriona prasinula* Fieb., 1866.—Algo frecuente en los Prados de Pozuelo y La Solana en Junio y Julio.

*Delphax obscurella* Boh., 1847. — No es rara en las orillas de los ríos Jabalón y Azuel del Pozuelo y La Solana, respectivamente. Abril.

— *forcipata* Boh., 1847 — Sólo dos ejemplares cerca del santuario de nuestra patrona la Virgen de los Santos. Julio.

— *Fieberi* Scott, 1878.—Raro en los arroyos de la Virgen de los Santos. Julio.

— *venosa* Germ., 1838. — Poco frecuente en Pozuelo en el cerro del Artesón. Enero y Febrero.

— *Daley* Scott, 1870. — No muy frecuente en el prado juncal de Pozuelo y ribera del Guadiana, en Ciudad Real. De Julio a Setiembre.

Fam. TETTIGOMETRIDAE Germ., 1821

*Tettigometra sulphurea* M. R. var. *mendax* Horv., 1888.—Frecuente con el tipo en Pozuelo, Ciudad Real y La Solana Setiembre, Octubre

— — var. *scutellaris* Horv., 1903. — También con el tipo, pero sólo dos ejemplares en Pozuelo. Sólo se ha citado de Servia.

— *concolor* Fieb., 1865.—Se coge con frecuencia en Pozuelo y Fuencaliente sobre los enebros y las encinas. Setiembre, Octubre.

Difiere de *virescens* var. *concolor* Fieb., porque en ésta el clipeo es amarillo.

— *griseola* Fieb. var. *bimaculata* Sign., 1886. — Entre los ejemplares típicos de Pozuelo. Muy rara en Junio. También en La Solana. Julio.

Fam. PSYLLIDAE Latr. 1807

*Livia crefeldensis* Mink, 1855.—Rara en el prado juncal de Pozuelo en Junio. Común en Fuencaliente sobre *Taxus baccata* L. Junio.

*Aphalara lichenoides* Put., 1898. — Especie descrita de Orán y hallada por mí en varios ejemplares en los alrededores de la Virgen de los Santos. Mayo.

— *nervosa* Foers., 1848. — Algo frecuente junto a la Virgen de los Santos y en la Dehesilla de Ballesteros, en Abril y Mayo, sobre *Achillea millefolium* L., donde el insecto practica pequeñas excavaciones en la faz superior de las hojas.

— *subpunctata* Foers., 1848. — Muy rara en las cercanías de la Virgen de los Santos. Junio.


*Psylla pyri* L., 1758.—Algo frecuente en Junio, Julio y Agosto en Pozuelo en la huerta de los Baños de San Cristóbal y en la Celadilla sobre los perales, cuyas hojas y tallos ensucia con sus excrementos, cubriéndolos de una sustancia glutinosa buscada por las hormigas.

*Arytaena adenocarpi* F. Loew, 1879. — Frecuente en Mayo en los cerros inmediatos a la Virgen de los Santos sobre *Adenocarpus hispanicus* DC.

*Trioza chenopodii* Reut., 1876.—No es rara en los huertos y prados de Pozuelo sobre *Atriplex patula* L., Febrero, Marzo.

— *distincta* Fl., 1861. — Rara en los montes de la Virgen de los Santos. Mayo.





# BOLETÍN

DE LA REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA

## DE HISTORIA NATURAL

TOMO XX.—1920



MADRID

MUSEO NACIONAL DE CIENCIAS NATURALES

HIPÓDROMO. — TELÉF. S-443.

—  
1920