

## DESCRIPTION DE PLUSIEURS HÉMIPTÈRES NOUVEAUX

## HOMOPTÈRES.

## Famille des TETTIGONIDES.

(Continuée de la page 352).

## Gen. BYTHOSCOPIUS, Germar.

1. *Bythoscopus Sanguinolentus*. BYTHOSCOPE SANGUINOLENT, *nov. spec.*—Longueur .12 pouce. D'un jaune brun, quelque peu fuligineux. Tête variée de roussâtre et de blanchâtre, avec deux points noirs très distincts sur le bord antérieur. Thorax rayé de bandes alternes roussâtres et blanchâtres. Elytres enfumées, à nervures d'un violet sanguinolent; deux lignes blanches partant de la base et se dirigeant obliquement vers la suture, et une autre s'allongeant vers la nervure costale. Dessous et pattes d'un jaunâtre brun.

Très commun. Dès le mois d'Avril on trouve ce Bythoscope dans les terrains sablonneux exposés au midi, particulièrement dans les pentes des coteaux.

2. *Bythoscopus 4-punctatus*. BYTHOSCOPE À 4 POINTS, *nov. spec.*—Longueur .12 pouce. D'un jaune brun plus ou moins foncé. Tête varée de jaune et de brun, avec deux points noirs sur le bord antérieur. Prothorax avec deux gros points noirs près du bord postérieur, en ligne avec ceux de la tête; d'autres points moins marquants se montrent aussi quelquefois en avant de ceux-ci. Elytres d'un jaunâtre sale, à nervures plus claires. Dessous brun; pattes jaunâtres.

Commun. Très rapproché du précédent, mais s'en distinguant facilement toutefois par la présence de ses 2 points noirs sur le bord postérieur du prothorax.

## Gen. PEDIOPSIS, Burmeister.

*Pediopsis flavescens*. PÉDIOPSE JAUNÂTRE, *nov. spec.*—Long. .12 pouce. Jaunâtre; thorax lavé de brunâtre; élytres hyalines, lavées de jaunâtre à la base, portant près du milieu et au sommet des taches mal



DESCRIPTION DE PLUSIEURS HÉMIPTÈRES NOUVEAUX.

définies et plus ou moins apparentes. Vertex étroit, légèrement triangulaire en avant, de même que la partie antérieure du prothorax. Elytres plus longues que le corps. Dessous et pattes aussi jaunâtres—AR.

Gen. MACROPSIS, Lewis

1. **Macropsis clitellarius.** MACROPSE À SELLE, *nov. spec.*—Long. .18 pce. D'un jaune orange; yeux gris; joues, front, thorax, sans aucune tache ni point. Elytres de la même couleur, avec une grande tache jaune-clair en forme de selle, partant de l'angle huméral et se dirigeant obliquement vers la suture qu'elle rencontre un peu en arrière du milieu; cette tache jaune le plus souvent séparée du reste par une ligne foncée. Corps de la même couleur, avec lignes pâles sur chaque anneau. Poitrine pâle. Les élytres hyalines au sommet et sans aucun élargissement au côté interne.

Très rapproché par sa coloration du *Bythoscopus clitellarius*, Fitch, mais s'en distinguant toutefois par la suture droite des élytres, l'absence des deux points noirs sur le front, et sa taille plus petite.

2. **Macropsis ocellatus.** MACROPSE OCELLÉ, *nov. spec.*—Long. .15 pce. D'un beau jaune citron. Tête très longue, vertex très étroit. Ocelles petits, mais bruns et très apparents; vertex taché de brunâtre au milieu. Thorax légèrement bombé au milieu, avec une impression transversale droite en avant. Elytres jaunes à la base, hyalines au sommet. Pattes et dessous jaunes, dos noir à la base.—R.

Gen. JASSUS, Fabricius.

1. **Jassus aurantiacus.** JASSE ORANGÉ, *nov. spec.*—Long. .22 pce. D'un fond orange parsemé de point rouges nombrenx sur le vertex et le prothorax. Ecusson avec une ligne noire à sa partie antérieure, le reste orange pointillé de roux, mais plus clair que le prothorax. Elytres oranges avec lignes rouges interrompues, presque hyalines, surtout au sommet. Dessous d'un jaune pâle, côtés du dos noirs.

2. **Jassus subcupræus.** JASSE PRESQUE CUIVRÉ, *nov. spec.*—Long. .18 pce. D'un jaune ochracé à reflets métalliques; une bande jaune-clair au sommet du front avec 2 gros points noirs très rapprochés du milieu. Prothorax pointillé de brunâtre. Elytres presque hyalines, lavées d'un jaunâtre métallique. Dessous jaune sans aucune tache.

Les deux points noirs sur le front et l'absence de lignes sur les élytres distinguent cette espèce de la précédente.



3. *Jassus melanogaster*. JASSE VENTRE-NOIR, *nov. spec.* — Long. .20 pce. D'un beau jaune métallique, vertex et prothorax rougeâtres, écusson plus clair; front avec une ligne de 4 points noirs au sommet. Pattes jaunes; ventre noir; dos noir avec les bords jaunes.

Assez rapproché de *l'aurantiacus*, mais plus grêle et avec points noirs au front.

4. *Jassus 6-punctatus*. JASSE À 6 POINTS, *nov. spec.* — Long. .15 pce. Tête jaunâtre, avec 2 points noirs en avant, en dessus; thorax grisâtre, blanchâtre en avant, avec 2 points noirs de chaque côté; écusson d'un jaunâtre clair avec les 2 angles antérieurs noirs, formant ainsi, avec ceux du prothorax et de la tête, 6 points noirs sur 2 lignes. Elytres pâles avec les nervures presque blanches, ces nervures bordées de brun dans chaque cellule. Pieds jaunâtres tachetés de brun; dessous brun. —AR.

Les six points noirs de cette espèce la distinguent à première vue de toutes les autres.

5. *Jassus citronellus*. JASSE CITRONELLE, *nov. spec.* — Long. .12 pce. D'un beau jaune citron. Tête triangulaire, assez longue; yeux gris; front avec lignes brunes transversales. Vertex et prothorax sans aucune tache. Elytres d'un beau jaune, légèrement transparentes. Pattes et poitrine jaunes; abdomen noir à la base, dos noir excepté à l'extrémité. —C.

6. *Jassus nervatus*. JASSE À NERVURES CLAIRES, *nov. spec.* — Long. 11 pes. Noir et jaune. Tête jaune; 2 taches noires sur le vertex, une autre au milieu du front, joues jaunes, rostre noir. Thorax jaune avec une ligne noire en arrière. Elytres brunes avec les nervures d'un jaune clair; ailes légèrement enfumées. Cuisses noires, jambes antérieures jaunes; corps noir. —R.

Espèce bien remarquable par ses nervures claires sur un fond brun.

#### Gen. *TYPHLOCYBA*, Germar.

*Typhlocyba rosea*. TYPHLOCYBE ROSE, *nov. spec.* — Long. .15 pce. Tête et thorax jaunâtres, avec lignes brunes plus ou moins distinctes. Elytres d'une belle couleur rosée, avec nervures presque rouges et portant deux rangées de taches brunâtres; une nervure presque parallèle au bord externe, borde le sommet de chaque élytre au côté interne. Dessous et pattes jaunâtres; ventre brun avec les bords jaunes.

Se trouve dans l'herbe, particulièrement dans les lieux



humides. Les taches brunes des élytres font à première vue reconnaître ce joli insecte. La couleur rose manque quelquefois aux élytres.—CC.

Gen. DIRAPHIA, Waga.

**Diraphia viridescens.** DIRAPHIE VERDATRE, *nov. spec.*—Long .21 pce. D'un vert jaunâtre; tête d'un jaune orange; yeux bruns. Thorax et dos d'un vert tendre; antennes noires à l'extrémité, jaunes à la base. Dessous et pattes jaunes, sans aucune tache. Elytres de la moitié plus longues que le corps, légèrement lavées de jaune. Gaine de la tarrière des femelles d'un brun rougeâtre.—PC.

Se trouve dans l'herbe des prés. Diffère de la *D. vernalis*, Fitch, par sa poitrine sans aucune tache.

Gen. PSYLLA, Geoffroi.

1. **Psylla ochracea.** PSYLLE OCHRACÉE, *nov. spec.*—Long. .10 pes. D'un beau jaune d'ocre. Yeux gris, très saillants. Antennes légèrement épaissies à l'extrémité, le dernier article terminé par 2 soies brunes. Elytres jaunâtres, peu transparentes, enfumées à l'extrémité, plus longues que le corps. Pattes jaunâtres.—PC.

Une variété se présente avec le corps plus ou moins noir, excepté sur les côtés.

**Psylla brunnea.** PSYLLE BRUNE, *nov. spec.*—Long. .10 pce. Variée de noir et de rougeâtre. Thorax noir bordé de rougeâtre, corps d'un brun foncé, une bande rouge en dessous à la base de l'abdomen. Elytres blanchâtres, à nervures brunes. Pattes brunes; antennes noires à l'extrémité.—PC.

---

## FAITS DIVERS.

---

**The American Ornithologist.**—Sous le titre ci-dessus, MM. C. S. Maynard & R. Deane, de Cambridge, Massachusetts, vont commencer prochainement la publication d'un magasin spécialement dévoué à l'histoire scientifique et populaire des oiseaux. Dans chaque numéro des arti-



LE

# Naturaliste Canadien



Bulletin de recherches, observations et découvertes se rapportant  
à l'Histoire Naturelle du Canada.

---

## TOME QUATRIÈME

---

L'ABBÉ L. PROVANCHER, RÉDACTEUR-PROPRIÉTAIRE



QUÉBEC

C. DARVEAU, IMPRIMEUR-ÉDITEUR  
N° 8, Rue Lamontagne.

1872.



# LE Naturaliste Canadien

---

Vol. IV. Caprouge, DECEMBRE, 1872. No. 12

---

Rédacteur : M. l'Abbé PROVANCHER.

---

## FAUNE CANADIENNE.

### LES OISEAUX.

(Continuée de la page 327).

#### 2. Gen. PAON. *Pavo*, Linné.

Tarses armés d'éperons dans les mâles. Ailes assez courtes. Queue démesurément longue. Tête ornée d'une aigrette mobile et légère, peinte des plus riches couleurs.

**Le paon domestique.**—*Pavo cristatus*, Linné.—Le Paon est originaire des Indes Orientales; il fut apporté en Europe par Alexandre et ne s'y trouve encore qu'en domesticité.

Si l'empire appartenait à la beauté et non à la force, le Paon serait, sans contredit, le roi des oiseaux. Pour nul autre la nature ne s'est montrée aussi prodigue de ses trésors. Noblesse des formes, taille des plus avantageuses, port le plus imposant, démarche gracieuse, richesse du plumage, tout se réunit pour faire du Paon le plus charmant des oiseaux.

Comme le Coq, le Paon mâle a ses tarses armés d'éperons redoutables, et non moins que lui, il sait en tirer parti dans les combats.

A 2 ou 3 ans le Paon est adulte, et ce n'est qu'alors que la femelle commence à pondre et que le mâle voit sa queue parfaitement développée. Ce n'est aussi qu'à cet âge qu'il commence à faire la roue, c'est-à-dire à faire prendre