

- Jung. verm.* 161, 162. Populi nigræ vermes s. Muscæ.
Ambros. hort. 97. t. 96 Folliculi in pediculis foliorum Populi nigræ.
Hoffm. alt. hort. 5. Culices in Populo nigra.
Rupp. jen. 3. p. 333. Culices in Populo nigra.
 Habitat in utriculis ovatis ore perviis petiolis innatis vel in sacculis coloratis superne dehiscentibus vel clausis sub foliorum disco in *Populo nigra* ad Runnaby, Gothoburgi, Holmiæ, nunc Upsaliæ.

999. APHIS *Aceris* *Aceris* platanoidis. *Fn.* 709.

Reaum. gall. 3. t. 22. f. 6-10.

Habitat in *Aceris* platanoidis foliis.

DESCR. Corpus latius. Caput & Thorax in medio nigra. Abdomen supra verrucis adpersum, postice macula fusca cordata antèrius bifida: corniculis oblitteratis obrutissimis. Antennæ sericeæ.

1000. APHIS *Atriplicis* *Atriplicis* littoralis.

Habitat in *Atriplicis* littoralis foliis, quæ inde revolvuntur longitudinaliter in cylindrum, intra quem vagantur obtectæ.

DESCR. Corpus viride: corniculis minutis. Oculi nigri.

Chermes.

1001. CHERMES *graminis* *Airæ* flexuosæ. *Fn.* 673.

Habitat in *Airæ* flexuosæ.

DESCR. Magnitudo Cicadæ & ejusdem faciei, ut primo intuitu Cicadæ species salutareretur. Antennæ albicant apicibus nigris. Alæ quatuor non in crucem complicatæ, sed deflexæ, ut in phalænâ. Abdomen nigricans incituris margine albis. Pedes albi, non saltatorii. Caput obtusissimum, una cum thorace griseum, lineolis albis pictum. Alæ aqueæ, venis fuscis variis anatomosis.

1002. CHERMES *Ulmæ* *Ulmæ* campestris. *Fn.* 694.

Habitat intra revoluta folia *Ulmæ* campestris cum Aphidibus ejusdem.

DESCR. Larva subrotunda, cinerea punctis elevatis nigris: obtecta lanugine alba copiosa.

1003. CHERMES *Cerastii* *Cerastii* viscosi. *Fn.* 695.

Habitat in *Cerastio* viscoso monâroso foliis ventricoso-inflexis in capitulum.

1004. CHERMES *Pyri* *Pyri* communis.

Habitat in *Pyro* vulgari.

DESCR.

DESCR. Corpus griseum. Abdomen breve striis transversis albidis. Alæ margine dorsali puncto obscuro.

1005. CHERMES *Calthæ* *Calthæ palustris*.

Habitat in *Calthæ palustris* floribus.

DESCR. Antennæ clavatæ; longitudine thoracis, apice nigræ. Thorax lutescens: lineis duabus arcuatis ex una basi versus latera flexis & tertio arcu transversali postico priores intertecante. Alæ albæ: superiores venis flavescensibus & puncto communi fusco.

1006. CHERMES *Urticæ* *Urticæ dioicæ*. Fn. 702.

Habitat in *Urtica dioica*.

DESCR. Fusca lateribus pedibusque albidis. Cauda reflexa. Antennæ nigræ versus basin albæ. Oculi flavescens.

LARVA monstrosa, facies pediculi, depressa; ventre ciliato.

1007. CHERMES *Betulæ* *Betulæ albæ*. Fn. 697.

Habitat in *Betula alba*, succo viridi tinctorio plena.

DESCR. Abdomen incarnatum linea transversa lata nigra in singula incisione solitaria, scilicet 5 in tergo, 3 in ventre. Petus pallidum, ut & caput. Antennæ feracæ: Cauda acuta; Alæ 4 pellucidæ, nigræ. Succus viridis tinctorius intra corpus.

1008. CHERMES *Alni* *Betulæ Alni*. Fn. 698.

Æt. nps. 1736. p. 36. n. 27. Cimex cauda plumosa corpus tegente.

Frisch. germ. 8. p. 28. t. 13. Vermis suctorius alni.

Habitat in *Alno* cujus ramos vere operiunt & quasi lana vestiunt populæ.

DESCR. Insectum album, acuminatum. Oculi laterales, prominuli. Pedes sex, quorum duo posteriora paria propiora. Cauda acuminata, bifurca, supra hanc quasi stylus prominulus. Antennæ variegatæ. Os apice nigro, situm in ipso ventre inter primum & secundum par pedum. Alæ 4 albæ venis fuscis. Salit.

LARVA magnitudine pediculi, corpore planiusculo, viridi-maculato, ventre obtuso, pollice elevato, versus caudam nigro. Antennæ albæ, superne nigræ, tenues, rectæ. Elytrorum rudimenta. Cauda villis multis, reflexis, diaphanis, retroflexis, corpus regentibus, albis. Vescicula sive guttula intra lanam e cauda egressa sæpe observatur. Oculi rubri. Sedent plures in ramis alni proximæ, capite deorsum spectantes, ut alterius cauda proximam ex parte tegat.

1009. CHERMES *Quercus* *Quercus Roboris*.

Habitat in *Quercus Roboris* foliis.

DESCR. Corpus flavo-albicans. Elytra ad marginem exteriorem lituris quatuor fuscis & unica ad marginem interiorem.

1010. CHERMES *Fagi* *Fagi sylvaticæ*. It. scan. 65.

Reaum. inf. 3. t. 26. f. 1-6.

Habitat in *Fagi sylvaticæ* foliis.

1011. CHERMES *Abietis* Pini *Abietis*. *It. gotl.* 180.

Frisch. germ. 12. p. 10. t. 2. f. 3. Insectum tuberculi muricari arboris *Taxi*.

Flor. lapp. p. 218. n. 347. *E.*

Clus. pannon. p. 20. 21. *Picea pumila*.

Hoffman. fl. altd. 1. *Picea pumila*.

Habitat in *Abietis* turionibus, quæ fiunt in summitatibus ramorum monstrose imbricatis, dilatatis ad basin foliolis, brevioribus etiam factis, apud nos frequens, similis frago viridi. Corpus in ipsis ramorum *Abietis* extremitatibus fragiforme, habet extus supra se & inter squamas foliaceas imbricatas, in sinu squamarum, plurima animalcula parva, e quorum ano quasi lana prominet. Juxta basin hujus corpusculi s. fragi observatur lana majori in copia, in qua mater minorum, quæ causat fragum. Autumno omnes e suis strobilis exeunt alatae.

DESCR. Corpus pallide flavescens; Oculi fusci, & minimo puncto nigricante inter oculos. Antennæ setaceæ. Alas gerit uti *Chermes Alni*, Os sub thorace vel ex thorace. Non salit.

1012. CHERMES *Salicis* *Salicis*. *Fn.* 701.

Habitat in *Salice* varia.

DESCR. alba est. Abdomen supra maculis obsoletis. Thorax linea transversa nigra. Antennæ infra medium albæ, extra medium nigrae.

1013. CHERMES *Fraxini* *Fraxini excelsioris*. *Fn.* 703.)

Habitat in *Fraxino* excelsiore.

DESCR. Alis thoraceque nigro maculatis.

1014. CHERMES *Aceris* *Aceris Platanoidis*. *Fn.* 696.

Habitat in ramis & pedunculis *Aceris* *platanoidis*.

DESCR. Est inter hujus generis minores, vix pediculum majorem magnitudine superans. Totum a tergo e flavo virens subtus dilute virescens. Ani apice subulato, dilute viridi fuscescente, Oculi etiam dilute flavescientes.

Coccus.

1015. COCCUS *Hesperidum* *Hybernaculorum*. *Fn.* 722.

Hire. act. gall. 1692. p. 14. t. 14.

Frisch. germ. 12. p. 12.

Reaun. gall. 4. t. 1. f. amnes.

Act.

CAROLI LINNÆI,

Equit. aqr. de Stella Polari;

Archiatr. Reg. Med. & Botan. Profess. Upsal. &c.

FAUNA SVECICA

SISTENS

Animalia *SVECIÆ* Regni:
MAMMALIA, AVES, AMPHIBIA,
PISCES, INSECTA, VERMES.

DISTRIBUTA

PER

CLASSES & ORDINES,
GENERA & SPECIES,

CUM

DIFFERENTIIS SPECIERUM,
SYNONYMIS AUCTORUM,
NOMINIBUS INCOLARUM,
LOCIS NATALIUM,
DESCRIPTIONIBUS INSECTORUM.

EDITIO ALTERA, AUCTION.

Cum Privilegio S. R. Mitis Sveciæ & S. R. Mitis Poloniæ ac Electoris Saxon.

STOCKHOLMIÆ,

Sumtu & Literis Direct. LAURENTII SALVII,

I 7 6 I.

(Editio prima, 1746.)