

Naturhistorische  
R e i s e

durch einen Theil

S c h w e d e n s

von

Dr. F r. W e b e r,

Adjuncten der philosophischen Facultät zu Kiel, der  
physicalischen Gesellschaft zu Göttingen, der natur-  
forschenden zu Jena, der medicinischen zu  
Paris und Avignon Mitglieder,

und

D. M. H. M o h r,

Mitglieder der physicalischen Gesellschaft zu  
Göttingen.



---

Mit drei Kupfertafeln.

---

Göttingen. 1804.

Bei Heinrich Dieterich.

breniatis impressis notato; antennis pedibusque flavis.

Skjarsjö.

Statura E. *minimi*, sed quadruplo minor. Thorax rotundatus, connexus, medio canaliculatus. Ad utrumque canalis latus, linea a basi ad mediam thoracis partem impressa. Elytra laevia, picea nitida, apice flava. Antennae pedesque flavi.

Wir versäumten in Skjarsjö eine Zeichnung von dieser Art zu machen, unser Freund Ljungh wird sie aber gewiss uns bei Gelegenheit mittheilen.

*Tettigonia exilis* nigra, capite thorace et scutello aurantiacis, elytris hyalinis, nigro-variegatis; alis albis, hyalinis. T. I. f. 2<sup>a</sup> et 2<sup>b</sup>. Skjarsjö.

Caput aurantiacum, fronte nigra. Antennae flavae, articulo basali et duabus ultimis nigris. Thorax aurantiacus, lineis quatuor obsoletis flavis. Scutellum aurantiacum, basi apiceque punctis duobus flavis. Elytra hyalina, nigro-variegata. Alae totae albo-hyalinae. Pectus et abdomen nigra. Anus flavus. Pedes flavi, femoribus basi fuscis.

Lineam magnitudine emetens.

E

Diese schöne von Herrn Ljungh entdeckte, aber sehr seltene Art, verdanken auch wir seiner gütigen Mittheilung.

Zuerst sahen wir auch in Herrn Ljungh's reicher Sammlung die *Notonecta lutea* Müll. Alle spätere Schriftsteller, selbst Fabricius im *Systema Rhynogotorum*, scheinen diese sehr deutliche Art vernachlässigt oder gar nicht gekannt zu haben. Bloß Gmelin führt sie in seiner fast alle Namen enthaltenden Compilation mit auf, schreibt aber bloß die Müller'sche Diagnose ab. Da, so viel wir wissen, keine Beschreibung dieser Art bekannt ist, so führen wir hier eine an.

*Notonecta lutea*, elytris albo-flavis, margine exteriore fusco.

Suecia.

Müll. Zool. dan. prodr. n. 1176.

Gmel. Linn. syst. nat. p. 2119. n. 11.

Mullerus de hac specie notat :

“Nulla maris et foeminae differentia. Elytra et scutellum in *glauca* tomentosa hinc nunquam madent, in *lutea* contra tomento destituta, madida ex aqua trahuntur.”

*Descript. nostra.* Magnitudine fere *N. glaucae*, sed globosior et paulo breuior. Corpus fuscum. Caput, thorax, scutellum et elytra

## Erklärung der Kupfertafeln.

## Taf. I.

- Fig. 1. *Dryops fennica* nob. (*Dr aenea* Payk.,  
non Oliv.), in natürlicher Gröfse.
- Fig. 2. a. *Tettigonia exilis* n. sp., in natür-  
licher Gröfse.  
b. Vergrößert.
- Fig. 3. a. Ein kleiner caespes von *Conf.*  
*muscicola* Schrad., in natürlicher  
Gröfse.  
b. Ein Faden, stark vergrößert.
- Fig. 4. a. *Conf. Aegagropila* L., unver-  
größert.  
b. Ein Faden, viel vergrößert.
- Fig. 5. a. *Linckiae rugosae* Trentep. *affinis*  
Alga, unvergrößert.  
b. Ein Exemplar vergrößert.  
c. Ein Stückchen, stark vergrößert.
- Fig. 6. a. Ein caespes von *Conf. Acharii*  
nob.; natürliche Gröfse.  
b. c. Vergrößerte Fäden.
- Fig. 7. a. b. Fäden von *Conf. zonata*, einer  
neuen Art; stark vergrößert.



