

CAROLI A LINNÉ
SYSTEMA
NATURÆ,

TOM. I. PARS II.

EDITIO DUODECIMA REFORMATA.

H O L M I Æ,

IMPENSIS DIRECT. LAUR. SALVH, 1767.

upsalæ 1770.

Joh. N. Westring

- Pistaciæ. 33. *A. nigra*, alis albidis, tibiis longissimis, thorace verrucoso. *Gouan.*
Siml. vit. gesn. 49.
Camer. epit. 51.
Lob. ic. 100.
Dod. pempt. 780.
Baub. hist. 1. p. 279.
Tabern. hist. 1439.
Habitat in Pistacia vera, Terebintho, Lentisco, quibus e foliorum basi enascitur Folliculus incarnatus, ventricosus, utrinque attenuatus, spithameus, pollice crassior.
*Lentisci folliculus reniformis, compressus, ex parte laterali folii aucta; cum hic folliculus viridis est vivunt in eo Aphides, cum vero demum ruber evasit, ex eo exiere per linearem aperturam: Aphides flavæ annulis 15. Rostrum inflexum. Oculi nigricantes. Antennæ moniliformes. Abdomen pilice muticum. Alæ 4 erectæ in nonnullis. Lanugo alba globulis albis pellucidis mixta, sæpe adheret abdomini postice. *Vandellius.**

228. CHERMES. *Rostrum* pectorale.
Antennæ thorace longiores.
Alæ IV deflexæ.
Thorax gibbus.
Pedes saltatorii.

- Graminis. 1. *C. Airæ flexuosæ. Fn. succ. 1001. **
Faun. succ. 693. Chermes graminis.
Habitat in Graminibus, imprimis in Aira flexuosa.
- Ulm. 2. *C. Ulmi campestris. Fn. succ. 1002. **
Habitat intra folia revoluta Ulmi campestris.
- Cerastii. 3. *C. Cerastii viscosi. Fn. succ. 1003.*
Habitat in foliis Cerastii viscosi, conniventibus in capitulum.
- Pyri. 4. *C. Pyri communis. Faun. succ. 1004. **
Habitat in Pyri communis foliis.

5. *C.*

Chermis Larvæ pedatæ, sæpe villosæ; Volantia saliant, plantis insident.

- Sorbi. 5. *C. Sorbi aucupariæ*.
Habitat in Sorbo aucuparia.
Corpus supra lituris lineisque variis nigris; subtus vi-
rens. Thorax flavescens antice punctis 2, postice li-
neis 4 nigris.
- Calthæ. 6. *C. Calthæ palustris*. *Fann. suec. 1005. **
Habitat in Calthæ palustris floribus.
- Buxi. 7. *C. Buxi*.
Reaum. inf. 3. t. 29. f. 1 - 14.
Habitat intra Buxi folia summa conniventia; in Gallia.
- Urticæ. 8. *C. Urticæ dioicæ*. *Fn. suec. 1006. **
Habitat in Foliis Urticæ dioicæ.
- Betulæ. 9. *C. Betulæ albæ*. *Fn. suec. 1007. **
Habitat in Betula alba.
- Alni. 10. *C. Betulæ Alni*. *Fann. suec. 1008. ** *Kalm. it. 2.*
p. 275.
Frisch. inf. 8. t. 13. Vermis fuætorius Alni.
Schæff. elem. t. 39.
Sultz. inf. t. 12. f. 80.
Habitant in Betulæ Alni ramulis Larvæ, caudis plu-
mosis testæ; in America septentrionali. Kalm.
- Quercus. 11. *C. Quercus Roboris*. *Fn. suec. 1009. **
Habitat in Quercus foliis.
Corpus flavo albicans; Elytra ad marginem anteriorem
lituris 4 fuscis; unica vero ad posteriorem.
- Fagi. 12. *C. Fagi sylvaticæ*. *Fn. suec. 1010.*
It. scan. 65.
Reaum. inf. 3. t. 26. f. 1 - 6.
Habitat in Fagi sylvaticæ foliis.
- Abietis. 13. *C. Pini Abietis*. *Fann. suec. 1011. ** *Fl. lapp. 218.*
p. 347. E.
It. gotl. 180.
Clus. pan. 20, 21. Picea pumila.
Geoffr. parif. 487. Psylla 5.
Frisch. inf. 12. p. 10. t. 2. f. 3. Insectum tuberculi
muricati.

Habitat in Pini Abietis apicibus turionum, quæ inde, basi dilatatis foliolis abbreviatisque, baccam mentiuntur.

- Salicis. 14. *C. Salicis.* *Fn. suec.* 1012. *
Habitat in Salicibus variis.
- Fraxini. 15. *C. Fraxini excelsioris.* *Faun. suec.* 1013. *
Geoffr. parif. 486. n. 4.
Habitat in Fraxino excelsiore.
- Aceris. 16. *C. Aceris platanoides.* *Fn. suec.* 1014.
Habitat in Aceris platanoidis ramulis, pedunculis.
- Ficus. 17. *C. Ficus Caricæ.*
Reaum. inf. 3. t. 29. f. 22 - 24.
Habitat in Fico Carica.

229. COCCUS. *Rostrum* pectorale.

Abdomen postice terosum.

Alæ II erectæ masculis. *Feminæ* apteræ.

- Hesperidum. 1. *C. Hybernaculorum.* *Faun. suec.* 1015. *
Fn. suec. 722. *Coccus hesperidum.*
Schæff. elem. t. 48.
Act. parif. 1692. p. 14. t. 14.
Frisch. inf. 12. p. 12.
Reaum. inf. 4. t. 1.
Sultz. inf. t. 12. f. 81.
Geoffr. inf. 505. *Chermes hesperidum.*
Habitat in arboribus sempervirentibus Hybernaculi: uti Citri, Lauri, Quassie, &c.
- Aonidium. 2. *C. indarum arborum.*
Habitat in Aliæ arboribus sempervirentibus, ut in Camellia, aliisque.
Præcedenti minor, sed similis: Testa orbiculata, planiuscula, atro-purpureascent, centro s. vertice tuberculo rotundo rubro, quod in senescentibus aperitur.

Mas

Cocci tardi, imprimis matres gravidæ, plantis adhærent, sæpe ramis, aliæ radicibus, fere immobiles; Mares volatu saliant.