

stort, långsträckt lancettlikt eller snarare rhombiskt. Abdominalryggens pipor äro nästan lika långa som hela abdomen; svansen platt, lancettlik, något tillbakaböjd.

Aphis punctipennis ZETT. Fn. Lp. 1. 559: 4., Ins. x Dab
Lp. 311: 7. Vid Fardhem och Sanda (Gottl.) d. 25—28 Juni, 10 bevingade exemplar.

Famil. Psyllidæ WESTW.

Psylla Fraxini LIN. Vid Fardhem och Rohne på löfven af *Fraxinus excelsior*, Juni—Juli.

—— *picta* (*Chermes picta* ZETT. Fn. Lp. 553: 3). På tallbuskar i en skogshage vid Ledebro d. 24 Juli.

—— *elegantula* (*Chermes elegantula* ZETT. Ins. Lp. 310: 11). På albuskar vid Norsby på Fährö d. 11 Juli, i Berga park d. 3 Aug. (I Vestergöthland vid Tubbetorp, nära Skara, har jag äfven funnit den i Juli).

Psylla malachitica nob. ♀: parva vix $\frac{2}{3}$ lin. decimal. long. opaca læte æruginoso-viridis, antennis, tibiis tarsisque pallidis; oculis, antennarum apice tarsorumque articulis nigrofuscis, mesonoto luteo-picto, ano summo castaneo; alis mediocribus obtusis albis, atomis fuscis crebre & irregulariter adpersis.

Ett enda exemplar på *Myrica* i Rohne myr d. 2 Juli.

I anseende till antennernas korthet och vingarnes trubbighet är hon affin med *Psylla Rumicis* FALL. (= *Tettigonia exilis* WEBER und MOHR), men för öfrigt ganska olik.

Anteckningar öfver Insekter, som blifvit observerade på Gottland och i en del af Calmare Län, under sommaren 1850;

AF

A. G. DAHLBOM.

Inlemnad d. 19 November 1850.
