

Swamm. bibl. t. 3. f. 4.

Habitat in fluviis, stagnis, paludibus, loco limoso, præsertim in fluvio Sahla Upsaliæ.

692. NEPA abdominis margine ferrato. *De Geer.*

Frisch. germ. 6. p. 31. t. 14. Cimex aquaticus latior. Habitat in Aquis.

DESCR. Longe minor; facies Cimicis aut Notonectæ; dorso convexo absque aculeo caudæ. color fuscus.

Chermes.

693. CHERMES graminis.

Habitat *Fabunæ* in pratis.

DESCR. Magnitudo Cicadæ & ejusdem faciei, ut primo intuitu Cicadæ species saluteretur. *Antennæ* albicant apicibus nigris. *Alæ* quatuor non in cruce complicatæ, sed deflectæ, ut in phalana. *Abdomen* nigricans incisuris margine albis. *Pedes* albi, non saltatrices. *Caput* obtusissimum, una cum thorace griseum, lineolis albis pictum. *Alæ* aquæ, venis fuscis; variis anastomosibus.

694. CHERMES Ulmi.

Habitat intra revoluta folia *Ulmi* 219 cum Aphidibus ejusdem.

DESCR. Larva subrotunda, cinerea punctis elevatis nigris, oblecta lanugine alba copiosa.

695. CHERMES Ceraştii.

Habitat in *Ceraştio* 379 monstroso foliis ventricoso inflexis in capitulum.

696. CHERMES Aceris.

Habitat in ramis & pedunculis *Aceris* 303 nostratis.

DESCR. Est inter hujus generis minores, vix pediculus majorem magnitudine superans. Totum a tergo e flavo virens subrus dilute virescens. ani apice subulato, dilute viridi fuscescente. Oculi etiam dilute flavescentes.

697. CHERMES Betulæ.

Habitat in *Betula* 776, succo viridi tinctorio plenum.

DESCR. *Abdomen* incarnatum linea transversa lara nigra in singula incisura solitaria, scilicet 5 in tergo, 3 in ventre. *Pectus* pallidum, ut & caput. *Antennæ* setacæ: Cauda acuta: *Alæ* 4 pellucidæ, nitidæ. Succus viridis tinctorius intra corpus.

698. CHERMES Alni.

Act. upf. 1736. p. 36. n. 27. Cimex cauda plumosa corpus tegente.

Frisch.

Frisch. germ. 8. p. 28. t. 13. Vermis fuctorius alni.

Habitat in *Alno* 775, cujus ramos vere operiunt & quasi lana vestiunt pupulæ.

DESCR. Insectum album, acuminatum. *Oculi* laterales, prominuli. *Pedes* sex, quorum duo posteriora paria propiora. *Cauda* acuminata, bifurca, supra hanc quasi stylus prominulus. *Antennæ* variegatæ. *os* apice nigro, situm in ipso ventre inter primum & secundum par pedum. *Alæ* quatuor albæ venis fuscis. salit.

LARVA magnitudine pediculi, corpore planiusculo, viridi-maculato, ventre obtuso, postice elevato, versus caudam nigro. *Antennæ* albæ, superne nigrae, tenues, rectæ. *Elytrorum* rudimenta. *Cauda* villis multis, reflexis, diaphanis, retroflexis, corpus tegentibus; albis. *vesicula* sive guttula intra lanam e cauda egressa sæpe observatur. *oculi* rubri. Sedent plures in ramis alni proximæ, capite deorsum spectantes, ut alterius cauda proximam ex parte tegat.

699. CHERMES Pini.

Habitat in ramis *Pini* 788, ipsis ramis immutatis, lanæ instar insidens.

DESCR. Corpus fuscum, totum supra testum lana alba (non e cauda egressa), quæ quasi ex turundis crassiusculis componitur; magnitudo *Cimicis lectularii*, pedibus sex lente repens: denudatum corpus a lana totum fuscum, facie larvæ *Coccionellæ*: lana insidet toto dorso, abdomen subtus & totum corpus subtus glabrum. *Rostrum* non inflexum est versus pectus.

700. CHERMES Abietis. *It. gotl.* 180.

Frisch. germ. 12. p. 10. t. 2. f. 3. Insectum tuberculi muricati arboris *Taxi*.

Flor. lapp. p. 218. n. 347. *E.*

Clus. pannon. p. 20. 21. *Picea pumila*.

Hoffman. fl. altd. 1. *Picea pumila*.

Habitat in *Abietis* 789 turionibus, quæ fiunt in summatibus ramorum monstrose imbricatis, dilatatis ad basin foliolis, longitudine brevioribus etiam factis, apud nos in *Abiete* frequens, similis frago viridi.

DESCR. Corpus *Abietis* in ipsis ramorum extremitatibus fragiforme, habet extus supra se & inter squamas foliaceas imbricatas, in sinu squamarum, plurima animalcula parva, e quorum ano quasi lana prominet. Juxta basin hujus corpusculi l. fragi observatur lana major in copia, in qua marer minorum, quæ causat fragum. Muratur in volatile: *alis* 4, aqueis; corpore pallide flavescente; oculis fuscis, & minimo puncto nigricante inter oculos. *Antennæ* setaceæ. *Alas* gerit uti *Chermes Alni*. *os* obtusum, inflexum, uti *Grylli*,

701. CHERMES Salicis.

Habitat in *Salice* varia.

O 4

DESCR.

DESCR. Hæc alba est. *Abdomen* supra maculis obsoletis. *Thorax* linea transversa nigra. *antennæ* infra medium albæ, extra medium nigrae.

702. CHERMES *Urticæ*.

Reaum. inj. 3. t. 29. f. 20, 22. 13.

Habitat in *Urtica* *major* 774.

DESCR. Hæc fusca lateribus pedibusque albidis. *cauda* reflexa. *antennæ* nigrae versus basin albæ. *oculi* flavescentes.

LARVA. monitrosa, facies pediculi, depressa, ventre ciliato.

703. CHERMES *Fraxini*. *De Geer*.

Habitat in *Fraxino* 830.

DESCR. Alis thoraceque nigro maculatis.

Aphis.

704. APHIS *Ribis*.

Leuvenh. arcan. epist. 90. p. 545. t. 548. f. 1. 2. 3.

Aelbescen-luyfen.

Jung. verm. p. 163. 164. *Ventriones ribiani* f. *Mel-lomyjæ*.

Blank. belg. p. 164. t. 14. f. D. E. *Pediculus ribis viridis*.

Frisch. germ. 11. p. 9. t. 14. *Pediculus arboreus fusco-viridis* in *Ribe*.

Reaum. gall. 3. t. 22. f. 7. 8. 9. 10.

Habitat sub foliis *Ribes* 197, quæ inde puculas rubicundas obtinent.

DESCR. Magnitudo pediculi. *Corpus* incumbens. *pedum* viridum genicula dorso altiora, fusca. *antennæ* corpore longiores, tenues, rectæ, juxta caput geniculo reflectæ, nigrae. *Corpus* fusco-virens. *pectus* a tergo nigricans. Lineæ tres transversæ supra clunes, fere contiguæ: latera abdominis nigris punctis. *Alæ* quatuor, erectæ, compressæ, albæ, venis nigris, quarum duæ minimæ. *Podex* prominet: *appendices* setaceæ, alis breviores.

705. APHIS *Ulmi*. *De Geer*.

Reaum. gall. 3. t. 25. f. 4. 5. 6. 7.

Habitat in foliis *Ulmi* 219 vesiculas & foliorum convolutiones caussans.

DESCR. Minores subvirescentes; Majores corpore cylindrico ferrugineo alba lanugine adspersæ, abdomine 6 l. 7 articulis: *Appendiculis* obsoletis. ex ano vesicula.

706. APHIS *Pastinacæ*.

Habitat in *Pastinaca*.

DESCR.

CAROLI LINNÆI

MEDIC. & BOTAN. PROF. UPSAL; HORTI ACADEMICI PRÆFECT; ACAD. IMPERIAL:
MONSPELIENS: STOCKHOLM: UPSAL: SOC; HUIUSQUE SECRETAR.

FAUNA SVEVICA

SISTENS

Animalia *SVECIÆ* Regni:

QUADRUPEDIA, AVES, AMPHIBIA,
PISCES, INSECTA, VERMES,

DISTRIBUTA

PER

CLASSES & ORDINES,
GENERA & SPECIES.

CUM

DIFFERENTIIS SPECIERUM,
SYNONYMIS AUTORUM,
NOMINIBUS INCOLARUM,
LOCIS HABITATIONUM,
DESCRIPTIONIBUS INSECTORUM.

LUGDUNI BATAVORUM

CONRADUM WISHOFF

ET

GEORG. JAC. WISHOFF.

FIL. CONR.

Apud

1746.