

Horvath 1901

J. T. Polhemus
Library No. 6100

Author
card

Hem. Zichy 2:
on computer

catalogued

HEMIPTERÁK.

DR. HORVÁTH GÉZA

M. NEMZ. MUZEUMI IGAZGATÓ-ÓRTÓL.



HEMIPTERA.

CONSCRIPSIT

DR. G. HORVÁTH,

SECTIONIS ZOOLOG. MUSÆI NAT. HUNG. DIRECTOR.

pp 245-274

ÚJ VAGY KEVÉSBÉ ISMERT
FAJOK.SPECIES NOVAE VEL MINUS
COGNITAE.2. *Irochrotus caspius* JAK.

Ez a faj a többi rokonától felül fekete sörtével borított felülete által különbözik. A Minuszinszk mellett gyűjtött és $7\frac{1}{4}$ — $7\frac{1}{2}$ mm hosszú két nőstény példány csápjai és lábai egészen feketék.

Species corpore supra nigro-setoso ab omnibus congenericis mox distinguenda. Feminae duae $7\frac{1}{4}$ — $7\frac{1}{2}$ mm longae et ad Minusinsk lectae antennis pedibusque totis nigris gaudent.

37. *Eurydema dominulus* SCOP. var. *dauricum* MOTSCH.

REUTER O. M. (Berl. Ent. Zeitschr. 1885. p. 40) e fajváltozatot a var. *lhesgica* KOL- val azonosította. De ez a felfogás szerintem nem helyes, mert a MOTSCHULSKY-féle rovar testének alsó lapján az alapszín fehér, holott KOLENATI az övéről határozottan vörös alapszínt mond.

KOLENATI a Kaukazusból írta le rovarját, mely a törzsfajtól csak abban tér el, hogy czombjainak töve és lábszárainak középső része kissé fehéresek.

A MOTSCHULSKY-féle fajváltozat, melyet JAKOWLEFF később *Strachia festiva* L. var. *albiventris* név alatt írt le, csak Szibériában fordul elő.

Clariss O. M. REUTER (Berl. Ent. Zeitschr. 1885. p. 40.) varietatem hanc cum var. *lhesgica* KOLEX. eandem esse censuit. Opinio autem ista mihi incorrecta esse videtur, quia animalculum a MOTSCHULSKY descriptum corpore «subtus subalbo-annulato» gaudet, licet KOLENATI ventrem expresse coccineum indicat.

Specimina a KOLENATI e Caucaso descripta a typo tantum «femorum basi tibiae-rumque medio obsolete albidis» divergunt.

Varietas Motschulskyana, posterius a Dom. B. JAKOWLEFF ut *Strachia festiva* L. var. *albiventris* descripta, tantum Sibiriam inhabitat.

49. *Alydus calcaratus* LINN.

Egy Urga mellől származó nőstény az európai és szibériai példányoktól a következőkben tér el: A pronotum utófele és a szárnyfedők világosabb színűek, feketével alig pettyezettek, a pronotum fekete középvonala hiányzik s a scutellum sárgásfehér duzzadékos csúcsa csak igen gyengén van felfelé hajolva. Hossza $10\frac{1}{2}$ mm.

Femina ad oppidum Urga Mongoliae reperta a speciminibus europaeis et sibiricis lobo postico pronoti hemelytris-que pallidis vix nigro-conspersis, pronoto linea mediana nigra destituto apiceque scutelli flavo-albido in nodulum callosum vix elevato nonnihil divergit. Long. $10\frac{1}{2}$ mm.

Var. *hirsutus* KOL. (atratus MOTSCH.)

Ehhez a fajváltozathoz sorozok egy Burdukova szibériai falunál talált nagy, 13 mm hosszú nőstény példányt, melynek pronotuma és szárnyfedői egészen feketék; csak a corium közepe táján lehet néhány szennyesárga parányi petty nyomaikat észrevenni.

Ad hanc varietatem refero feminam magnam, 13 mm longam ad pagum sibiricum Burdukova lectam, cujus pronotum et hemelytra tota nigra sunt; tantum pars discoidalis corii habet atomos nonnullos obsoletos pallidos.

271. *Bactericera rossica* n. sp.

Fekete, kissé fénylő; a fejtető kétszer akkora széles, mint a saját hosszúsága; a csápok egészen feketék, hátrafelé a szárnyak tövén jóval túl nyúlnak és majdnem a potroh közepéig érnek, harmadik izülekük az első és második izüleknél valamivel karcsúbb, majdnem akkora hosszú, mint a fejtető szélessége és csaknem $2\frac{1}{2}$ -szer hosszabb, mint az első két izület együtvéve, a végső izületek fonálformák; a szárnyfedők átlátszók, üvegesek, majdnem $2\frac{1}{2}$ -szer hosszabbak, mint szélesek, közejük mögött valamivel szélesebbek, előszélük végük felé erősebben kerekített, végük tompászögetképez, erezetük vékony; a sugár-ér hosszú, gyengén görbült, a kar-ér radiális része háromszor akkora hosszú, mint annak discoidális része, a sugár-sejt legszélesebb helyén $\frac{2}{7}$ résznyivel szélesebb, mint a discoidális sejt legkeskenyebb helyén; a mell oldalai sárgával tarkítottak; a hasi szelvények utószélei, a lábszárak s a tarsusoknak első izülete sárgás-fehérek; a hátulsó czombok szürkés-barnák. ♂. A test hossza $1\frac{3}{4}$, a szárnyfedőkkel együtt $3\frac{m}{m}$.

♂. Az ivar-lemez rövid, zömök, oldalvást nézve akkora hosszú, mint széles, a csúcán jóformán csonkított; a fogó sárgás, karcsú, sarlóforma, előre hajlott s az ivarlemeznél valamivel magasabb.

Oroszország: Kazán, egy példány.

Az eddig ismert két fajtól nagyobb termete, felül egészen fekete feje és mellkasa, hosszabb csápjai, ezeknek kevésbé vastag s az első két izüleknél sokkal hosszabb harmadik izülete, valamint utófelük közepe táján legszélesebb szárnyfedői s ez utóbiáknak végük felé erősebben kerekített előszéle által különbözik.

Nigra, subnitida; vertice longitudine sua duplo latiore; antennis totis nigris, longe pone basin alarum extensis, fere dimidium abdominis attingentibus, articulo tertio articulis basalibus paullograciliore, latitudini verticis fere aequilongo et quam articulis duobus basalibus simul sumtis fere $2\frac{1}{2}$ longiore, articulis apicalibus filiformibus; homelytris hyalinis, fere $2\frac{1}{2}$ longioribus quam latis, pone medium paullo latioribus, margine costali apicem versus fortius curvato, apice obtuse angulatis, venis gracilibus; vena radiali longa, leviter curvata, parte radiali venae costalis triplo longiore quam parte ejus discoidali, spatio latissimo areae radialis quam spatio angustissimo areae discoidalis $\frac{2}{7}$ latiore; lateribus pectoris paullo testaceo-variegatis; limbo postico segmentorum ventralium, tibiis articuloque basali tarsorum flavo-albidis; femoribus posticis griseo-fuscis. ♂. Long. corp. $1\frac{3}{4}$, cum homelytris $3\frac{m}{m}$.

♂. Lamina genitáli brevi, crassiuscula, a latere visa aequae longa ac lata, apice subtruncata; forcipe testacea, gracili, falciformi, antrorsum curvata et lamina genitáli paullo altiore.

Rossia: Kazan, specimen unicum.

A speciebus duabus hucusque cognitis hujus generis differt statura majore, capite et thorace superne totis nigris, antennis longioribus, articulo tertio paullo minus incrassato et articulis duobus basalibus simul sumtis multo longiore, homelytris versus medium dimidii eorum apicalis latissimis margineque costali apicem versus fortius curvato.